

NOVINKA



STOTUX SIRUP

K léčbě všech druhů kašle

- Ideální pro předškolní a školní děti i kojence
- Vhodný i pro těhotné a kojící ženy



CO JE KAŠEL A JAK SE DĚLÍ?

CO JE KAŠEL?

- Kašel je **obranný mechanismus** těla a pomáhá čistit a uvolnit dýchací cesty od hlenu, prachu, cizích částic nebo mikroorganismů, které by mohly způsobit infekci či podráždění.
- Kašel sám o sobě není nemoc, jde o **příznak**, který pomáhá napovídat o tom, co se děje v těle. Obzvláště pokud se mění jeho charakter, přidávají se **další symptomy** nebo **trvá déle**, než je běžné.



DĚLENÍ KAŠLE – PODLE CHARAKTERU:

1. SUCHÝ kašel (NEPRODUKTIVNÍ)

- Bez vykašlávání hlenu
- Často dráždivý, štěkavý, záchvatovitý
- Typický pro začátek virové infekce, alergie, astma, reflux nebo podráždění (kouř, prach)
- Léčí se **antitusiky** (symptomatická léčba a tlumení kašle)

2. VLHKÝ kašel (PRODUKTIVNÍ)

- S vykašláváním hlenu
- Obvykle při bakteriálních nebo virových infekcích (např. bronchitida)
- Léčí se **mukolytiky** a **expektorancii** (na ředění hlenu a usnadnění vykašlávání)





STOTUX

INFORMACE O PŘÍPRAVKU

LÉČEBNÁ INDIKACE

- STOTUX je homeopatický léčivý přípravek používaný tradičně v homeopatii **k léčbě všech druhů kašle.**
- Přípravek je vhodný pro:
 - předškolní a školní děti
 - batolata a kojence **od 2 měsíců**
 - dospělé i dospívající
 - těhotné a kojící ženy





STOTUX - VÝHODY

- Přípravek mohou užívat:
 - děti od 2 měsíců
 - těhotné a kojící ženy
- Bez umělých sladidel
- Šetrná homeopatická léčba
- Vydrží 1 rok po otevření
- Pojistka proti kapání = snadné opětovné otevírání uzávěru



POPIS SLOŽEK (zdroj: SmPC)

- **ANTIMONIUM TARTARICUM** - produktivní kašel s hustým hlenem a obtížnou expektorací.
- **BRYONIA** - suchý, bolestivý kašel s pocitem dráždění.
- **COCCUS CACTI** - opakovaný spastický kašel. Záchvaty kašle vyvolané suchostí sliznic s expektorací vazkého hlenu.
- **DROSERA** - suchý, dráždivý, štěkavý, spastický kašel vyskytující se v záchvatech.
- **IPECA** - spastický prudký kašel s obtížnou expektorací.
- **RUMEX CRISPUS** - suchý (jen vzácně s expektorací), spastický, neustávající kašel. Dráždivost laryngotracheální sliznice. Kašel je zhoršený chladným vzduchem.
- **SPONGIA TOSTA** - suchý, štěkavý kašel často s pocitem pálení. Zhoršení při nádechu.
- **STICTA PULMONARIA** - suchý, dráždivý, neustávající kašel, vyčerpávající zejména v noci, zhoršení při nádechu.



LÉČBA KAŠLE – SIRUPY BOIRON

Doporučení pro komunikaci v lékárnách: cílové skupiny

STOTUX:

- Maminkám s předškolními a školními dětmi
- Malým dětem od 2 měsíců (maminkám, které požadují maximálně šetrnou léčbu)
- Těhotným a kojícím ženám
- Na všechny druhy kašle



STODAL:

- Starším dětem, dospívajícím a dospělým (SPC: od 2/4 let)
- Loajálním zákazníkům k zavedené značce
- Zákazníkům s preferencí rostlinných sirupů



DROSETUX NEO:

- Na suchý, dráždivý kašel, kde není výrazná expektorace (např. noční záchvaty dráždivého kašle, štěkavý kašel apod.)
- Bez omezení věku
- Děti od narození, těhotné a kojící ženy

ZKRÁCENÁ INFORMACE DLE SMPC

Název přípravku: **STOTUX sirup.** Léčivé látky: 100 g sirupu obsahuje: Antimonium tartaricum 6 CH 2 g, Bryonia 3 CH 2 g, Coccus cacti 4 CH 2 g, Drosera 3 CH 2 g, Ipeca 3 CH 2 g, Rumex crispus 6 CH 2 g, Spongia tosta 4 CH 2 g, Sticta pulmonaria 3 CH 2 g. **Indikace:** Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě všech druhů kašle. **Dávkování:** Děti od 2 do 3 měsíců: 5 ml 3x denně. Děti od 3 měsíců do 11 let: 5 ml 3-5x denně. Dospělí a dospívající od 12 let: 15 ml 3-5x denně. Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. **Zvláštní upozornění:** Tento léčivý přípravek obsahuje: 3,4 g sacharózy v dávce 5 ml a 10,2 g sacharózy v dávce 15 ml. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat. Obsahuje 35 mg ethanolu v dávce 5 ml a 104 mg ethanolu v dávce 15 ml. Množství alkoholu v dávce 5 ml odpovídá méně než 1 ml piva nebo 1 ml vína, v dávce 15 ml pak množství alkoholu odpovídá méně než 2 ml piva nebo 1 ml vína. Takto malé množství alkoholu nemá žádné znatelné účinky. Obsahuje 5,4 mg kyseliny benzoové v dávce 5 ml a 16,2 mg kyseliny benzoové v dávce 15 ml. Zvýšení hladiny bilirubinu v krvi po jeho uvolnění z albuminu může zesílit novorozenecký ikterus, který se může vyvinout do kernikteru (ložiska nekonjugovaného bilirubinu v mozkové tkáni). **Interakce:** Žádné se neočekávají. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Na základě dostupných údajů se přípravek Stotux může používat u těhotných a kojících žen. **Nežádoucí účinky:** Neočekávají se žádné nežádoucí účinky. **Držitel rozhodnutí o registraci:** BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. **Registrační číslo:** 93/407/18-C. **Datum revize textu:** 23. 1. 2024. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Název přípravku: **STODAL sirup.** Léčivé látky: 100 g sirupu obsahuje: Droserae tinktura...0,95 g, Pulsatilla 6 CH...0,95 g, Rumex crispus 6 CH...0,95 g, Bryonia 3 CH...0,95 g, Ipecacuanha 3 CH...0,95 g, Euspongia officinalis 3 CH...0,95 g, Sticta pulmonaria 3 CH...0,95 g, Kalii stibii tartras 6 CH...0,95 g, Myocardium 6 CH...0,95 g, Dactylopius coccus 3 CH...0,95 g, Balsami tolutani sirupus...19,00 g, Polygalae sirupus...19,00 g. **Indikace:** Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití. **Dávkování:** Děti od 2 do 4 let: 2,5 ml 3-5 × denně. Děti od 5 do 11 let: 5 ml 3-5 × denně. Dospělí a dospívající od 12 let: 15 ml 3-5 × denně. Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zánět žaludku (gastritis), žaludeční vředy. **Zvláštní upozornění:** Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74 % V/V ethanolu, tj. do 206 mg ethanolu v jedné dávce (15 ml), což odpovídá 5,22 ml piva nebo 2,18 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat. Přípravek obsahuje 11,25 g sacharózy v jedné dávce (15 ml). Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Tento léčivý přípravek obsahuje 85 mg kyseliny benzoové ve 100 g sirupu. 2,5 ml sirupu obsahuje 34,5 mg ethanolu, 2,65 mg kyseliny benzoové a 1,875 g sacharózy. 5 ml sirupu obsahuje 69 mg ethanolu, 5,3 mg kyseliny benzoové a 3,75 g sacharózy. 15 ml sirupu obsahuje 206 mg ethanolu, 16 mg kyseliny benzoové a 11,25 g sacharózy. **Interakce:** Nejsou známy. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Z důvodu nedostatku specifických údajů se použití přípravku v těhotenství a při kojení nedoporučuje. Je rovněž třeba vzít v úvahu, že přípravek obsahuje ethanol. **Nežádoucí účinky:** U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže. **Držitel rozhodnutí o registraci:** BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. **Registrační číslo:** 94/700/92-C. **Datum revize textu:** 31. 10. 2018. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Název přípravku: **DROSETUX NEO sirup.** Léčivé látky: 100 g sirupu obsahuje: Arnica montana 4 CH...0,1 g, Belladonna 4 CH...0,1 g, Cina 4 CH...0,1 g, Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH...0,1 g, Corallium rubrum 4 CH...0,1 g, Cuprum metallicum 5 CH...0,1 g, Drosera 4 CH...0,1 g, Ferrum phosphoricum 5 CH...0,1 g, Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH...0,1 g, Solidago virga aurea 3 DH...0,1 g. **Indikace:** Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle. **Dávkování:** Děti do 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4 × denně. Děti od 5 do 11 let: 5 ml sirupu 3-5 × denně. Dospělí a dospívající od 12 let: 15 ml sirupu 2-3 × denně. Perorální podání. Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky, rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy, dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy a dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje natrium-benzoát. Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 6,5 mg natrium-benzoátu, dávka 5 ml sirupu obsahuje 13,1 mg natrium-benzoátu a dávka 15 ml sirupu obsahuje 39,3 mg natrium-benzoátu. Zvýšení hladiny bilirubinu v krvi po jeho uvolnění z albuminu může zesílit novorozenecký ikterus, který se může vyvinout do kernikteru (ložiska nekonjugovaného bilirubinu v mozkové tkáni). Tento léčivý přípravek nemá být užíván v případě produktivního kašle (vlhkého kašle), neboť při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách. **Interakce:** Přípravek se nemá užívat současně s expektorancii. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a v období kojení. **Nežádoucí účinky:** Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. **Držitel rozhodnutí o registraci:** BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. **Registrační číslo:** 93/286/16-C. **Datum revize textu:** 25. 5. 2023. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

SOUTĚŽ: STOTUX



NOVINKA



SOUTĚŽ: STOTUX

**2. Od kolika let je možné užívat
léčivý přípravek STOTUX® na
VŠECHNY druhy kašle?**

A. od 2 let

B. od 2 měsíců

C. od 4 let



SOUTĚŽ: STOTUX

2. Od kolika let je možné užívat
léčivý přípravek STOTUX® na
VŠECHNY druhy kašle?

A. od 2 let

B. od 2 měsíců

C. od 4 let

Gratulujeme!





**DĚKUJEME
ZA POZORNOST**