



Česká komora
farmaceutických
asistentů



Vaše zdraví si zaslouží ten největší respekt

ŠETRNÁ PÉČE PRO NAŠE MALÉ SUPERHRDINY



Vaše zdraví si zaslouží ten největší respekt



CORYZALIA PRO DĚTI & COLENTAL

CORYZALIA PRO DĚTI – RÝMA A NACHLAZENÍ

Perorální roztok v jednodávkovém obalu

CORYZALIA PRO DĚTI je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.



CORYZALIA PRO DĚTI – RÝMA A NACHLAZENÍ

Perorální roztok v jednodávkovém obalu

Dávkování:

- **Děti od narození: Jednu dávku aplikovat do úst 3-6x denně, nejlépe mimo dobu jídla.**
- Intervaly mezi dávkami prodlužovat v závislosti na zlepšení.
- Celková denní dávka nemá překročit 6 dávek.
- Doporučená délka léčby je 7 dní.

Výtok z nosu

Kýchání

Ucpaný nos

Slzení



COLENTAL — KOJENECKÁ KOLIKA

Perorální roztok v jednodávkovém obalu

COLENTAL je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii **k léčbě kojenecké koliky u novorozenců a kojenců**, která se projevuje např. bolestí břicha, flatulencí a neklidem.



COLENTAL – KOJENECKÁ KOLIKA

Perorální roztok v jednodávkovém obalu

Dávkování:

- **Děti od narození: Před každým krmením podat dítěti 1 dávku do úst nebo ji nakapat do kojenecké lahve.**
- Intervaly mezi dávkami prodlužovat v závislosti na zlepšení.
- Celková denní dávka nemá překročit 6 dávek.

Nadýmání

Neklid

Bolest
bříška



LÉKOVÁ FORMA: JEDNODÁVKOVÉ OBALY

HYGIENICKÉ, STERILNÍ

- 100% sterilní
- Zabalené po 5 do aluminiových sáčků

PŘEDEM NADÁVKOVANÉ MNOŽSTVÍ

- Přesné dávkování díky použití vždy celého obsahu 1 dávky

PRAKTICKÉ

- Praktické a rychlé použití ve dne, v noci, doma, na cestách....

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

- Aplikace celého obsahu miminku do úst
- Miminko automaticky spolkne (stimulace sacího reflexu)





VÝHODY PEDIATRICKÉ ŘADY

Šetrná
homeopatická
léčba

Garance kvality
výchozích surovin

Léčba souboru příznaků
daného onemocnění

Přípravky se mohou
kombinovat s jinou léčbou



ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH DLE SMPC:

Název přípravku: COLENTAL perorální roztok v jednodávkovém obalu. **Léčivé látky:** jedna dávka (1 ml) obsahuje: Carbo vegetabilis 5 CH 333,3 mg, Colocynthis 9 CH 333,3 mg, Cuprum metallicum 5 CH 333,3 mg. **Indikace:** Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě kojenecké koliky u novorozenců a kojenců, která se projevuje např. bolestí břicha, flatulencí a neklidem. **Dávkování:** Děti od narození: Před každým krmením podat dítěti jednu dávku do úst nebo ji nakapat do kojenecké lahve. Denní dávka nemá přesáhnout 6 dávek během 24 hodin. Intervaly mezi dávkami prodlužovat v závislosti na zlepšení. **Způsob podání:** Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky tohoto přípravku. **Zvláštní upozornění:** Tento roztok je určený pouze k perorálnímu podání. Nesmí se aplikovat do nosu, očí nebo uší. Perorální roztok se nesmí podávat injekčně. V případě neutišitelného pláče trvajícího déle než 2 hodiny, zvracení, přítomnosti krve ve stolici, výskytu podlitin, horečky a příznaků přetrvávajících po dobu 48 hodin je vždy nutné konzultovat zdravotní stav dítěte s lékařem. **Interakce:** Žádné interakce se neočekávají. **Nežádoucí účinky:** Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Před otevřením sáčku: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření sáčku: Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Držitel rozhodnutí o registraci:** BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. **Registrační číslo:** 93/436/20-C. **Datum první registrace a revize textu:** 15. 8. 2023. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Název přípravku: CORYZALIA PRO DĚTI perorální roztok v jednodávkovém obalu. **Léčivé látky:** jedna dávka (1 ml) obsahuje: Allium cepa 3 CH 200 mg, Belladonna 3 CH 200 mg, Gelsemium 3 CH 200 mg, Kalium bichromicum 3 CH 200 mg, Sabadilla 3 CH 200 mg. **Indikace:** Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rinitidy a nachlazení, které se projevují např. nosní sekrecí, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením. Přípravek je určen pro děti od narození do 12 let. **Dávkování:** Děti od narození: Jednu dávku aplikovat do úst 3-6x denně, nejlépe mimo dobu jídla. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Celková denní dávka nemá překročit 6 dávek. Léčba má být ukončena, jakmile příznaky nemoci vymizí. Doporučená délka léčby je 7 dní. Pokud se do 3 dnů příznaky nezlepší nebo dojde ke zhoršení, má být léčba konzultována s lékařem. **Způsob podání:** Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky tohoto přípravku. **Zvláštní upozornění:** Tento roztok je určený pouze k perorálnímu podání. Nesmí se aplikovat do nosu, očí nebo uší. Perorální roztok se nesmí podávat injekčně. V případě horečky musí být zdravotní stav vždy konzultován s lékařem nebo lékárníkem. **Interakce:** Žádné interakce se neočekávají. **Nežádoucí účinky:** Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Před otevřením sáčku: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření sáčku: Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Držitel rozhodnutí o registraci:** BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. **Registrační číslo:** 93/122/20-C. **Datum první registrace a revize textu:** 22. 8. 2023. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Název přípravku: CAMILIA perorální roztok v jednodávkovém obalu. **Léčivé látky:** Jedna dávka (1 ml) obsahuje: Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg, Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg, Rheum 5 CH 333,3 mg. **Indikace:** Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem). **Dávkování:** 3 až 6 jednotlivých dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů. Perorální podání. Pokud po 3 dnech léčby příznaky přetrvávají, lékař by měl posoudit, zda se jedná o potíže spojené s růstem zubů. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky tohoto přípravku. **Zvláštní upozornění:** Tento roztok je určený pouze k perorálnímu podání. Nesmí se aplikovat do očí ani do uší. Perorální roztok se nesmí podávat injekčně. **Interakce:** Žádné interakce se neočekávají. **Nežádoucí účinky:** Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Před otevřením sáčku: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření sáčku: Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Držitel rozhodnutí o registraci:** BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. **Registrační číslo:** 93/478/14-C. **Datum revize textu:** 12. 3. 2024. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Název přípravku: SEDALIA sirup. **Léčivé látky:** 100 g sirupu obsahuje: Chamomilla recutita 9 CH 1,5 g, Gelsemium 9 CH 1,5 g, Hyoscyamus niger 9 CH 1,5 g, Kalium bromatum 9 CH 1,5 g, Passiflora incarnata 3 DH 1,5 g, Datura stramonium 9 CH 1,5 g. **Indikace:** Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě nezávažných úzkostných stavů, jako je nervozita, neklid a podrážděnost, a lehkých poruch spánku u dětí od 1 roku. **Dávkování:** Děti od 1 roku: 5 ml sirupu ráno a večer. Děti od 1 roku do 2,5 let mají užívat tento léčivý přípravek pouze po předchozí poradě s lékařem. Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Dávka 5 ml sirupu obsahuje 3,9 g sacharózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje alkohol. Dávka 5 ml obsahuje 15 mg alkoholu, což odpovídá 0,4 % (V/V). Tento léčivý přípravek obsahuje 5,5 mg kyseliny benzoové v jedné dávce (5 ml), což odpovídá 1,11 mg/ml. Zvýšení hladiny bilirubinu v krvi po jeho uvolnění z albuminu může zesílit novorozenecký ikterus, který se může vyvinout do kernikteru (ložiska nekonjugovaného bilirubinu v mozkové tkáni). **Interakce:** Žádné interakce se neočekávají. **Nežádoucí účinky:** Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. **Držitel rozhodnutí o registraci:** BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. **Registrační číslo:** 93/240/03-C. **Datum revize textu:** 21. 3. 2022. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.



SOUTĚŽ



Vaše zdraví si zaslouží ten největší respekt

DĚTSKÁ ŘADA BOIRON: SOUTĚŽ

1. Který homeopatický léčivý přípravek Boiron je určený na dětskou rýmu?

A. Camilia®

B. Sedalia®

C. Coryzalia pro děti®



DĚTSKÁ ŘADA BOIRON: SOUTĚŽ

1. Který homeopatický léčivý přípravek Boiron je určený na dětskou rýmu?

A. Camilia®

B. Sedalia®

C. Coryzalia pro děti®

Gratulujem
e!



DĚTSKÁ ŘADA BOIRON: SOUTĚŽ

2. Od kolika let je možné užívat
léčivý přípravek Colental® na koliky?

A. od narození

B. od 1 měsíce

C. od 3 měsíců



DĚTSKÁ ŘADA BOIRON: SOUTĚŽ

2. Od kolika let je možné užívat léčivý přípravek Colental® na koliky?

A. od narození

B. od 1 měsíce

C. od 3 měsíců

Gratulujeme!



DĚTSKÁ ŘADA BOIRON: SOUTĚŽ

3. Který z léčivých přípravků dětské řady Boiron zmírňuje podrážděnost při prořezávání zoubků?

A. Sedalia®

B. Camilia®

C. Colental®



DĚTSKÁ ŘADA BOIRON: SOUTĚŽ

3. Který z léčivých přípravků dětské řady Boiron zmírňuje podrážděnost při prořezávání zoubků?

A. Sedalia®

B. Camilia®

C. Colental®

Gratulujeme!





DĚKUJEME ZA POZORNOST



Vaše zdraví si zaslouží ten největší respekt

